

# INFORMATIE OPLOSBAARHEID DIERGENEESMIDDELEN IN KALVERMELK

09-2017

werkzame stof	productnaam	oplostemperatuur	pH van de oplossing in water	houdbaarheid van het product in geneesmiddelenmelk van 42 °C
acetyl salicylzuur	Preventiron®	60°C	zuur	1 uur
ampicilline	Ampisol® 20%	40°C	licht basisch	1 uur
	Ampisol® 100%	40°C	neutraal	3 uur
broomhexine	Broomhexine 2%	40°C	zuur	direct gebruiken
	Drinkmix Doxy-B® 5%	40°C	licht zuur	direct gebruiken
chloortetracycline	Chloortetra 20%	40°C	zuur	direct gebruiken
colistine	Colistine 1200	40°C	licht zuur	direct gebruiken
	Coldostin® 4 800 000 IE/g	40°C	licht zuur	4 uur
doxycycline	Doxylin® 50% WSP	40°C	zuur	direct gebruiken
	Doxylin® 100%	40°C	zuur	6 uur
	Drinkmix Doxy-B® 5%	40°C	licht zuur	direct gebruiken
flumequine	Enterflume® kalf, kip	60°C	basisch	12 uur
natrium salicylaat	Na-salicylaat	40°C	neutraal	4 uur
	Sodium Salicyl® 80% WSP	40°C	neutraal	4 uur
neomycine	Neosol® 100%	40°C	licht zuur	24 uur
paromomycine	Parofor® 70 mg/g	40°C	neutraal	6 uur
oxytetracycline	Oxytetracycline HCl	40°C	zuur	direct gebruiken
tilmicosine	Tilmovet® 250mg/ml	40°C	zuur	4 uur
trim/sulfa	Cubarmix® 48%	60°C	neutraal	3 uur
	Trim/Sul 80/420	60°C	licht basisch	24 uur
tylosine	Tylogran® 1000 mg/g	40°C	licht zuur	3 uur

