

# D.Hydrat

## Vertaling van de originele SPC

### Samenstelling

Per ml:  
Natriumbicarbonaat 10 mg  
Glucose 30 mg  
Sucrose 10 mg  
NaCl 9 mg  
Cafeïne 0,375 mg

### Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

### Doeldieren

Rund (kalf)

### Indicaties

Symptomatische behandeling van dehydratatie.

### Contra-indicaties

Metabole alkalose

### Toediening en dosering

#### *Rund (kalf)*

Langzaam intraveneus  
Flacon van 500ml

### Wachttijd

#### *Rund (kalf)*

Vlees en slachtafval: 0 dagen

### Bijwerkingen

Te snelle intraveneuze toediening kan hypervolemie veroorzaken en leiden tot acuut longoedeem.

### Speciale waarschuwingen

#### **Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:**

De oplossing moet voor toediening op lichaamstemperatuur worden gebracht.

Intraveneuze toediening moet langzaam gebeuren en dient onmiddellijk gestopt te worden als er bijwerkingen optreden.

### Overdosering

Metabole alkalose, ademhalingsdepressie en acuut longoedeem.

### Onverenigbaarheden

Compatibiliteit met andere diergeneesmiddelen moet worden onderzocht voordat de producten worden gemengd om neerslagvorming te voorkomen.

### Bewaarcondities en houdbaarheid

Houdbaarheid in verkoopverpakking: 24 maanden.

Houdbaarheid na openen: onmiddellijk gebruiken, niet bewaren.