

Rehydex 2414

Vertaling van de originele SPC

Samenstelling

Per ml:
Glucose (in monohydraat vorm) 240 mg
Sorbitol 140 mg

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Diersoorten

Rund, varken, paard, schaap, hond

Indicatie

Hypoglycemie als gevolg van stoornissen in het energiemetabolisme.

Contra-indicaties

Algemene of lokale vochtophoping

Toediening en dosering

Langzaam intraveneus
Rund, paard: 250 - 500 ml
Kalf, veulen: 50 - 100 ml
Varken, schaap: 50 - 100 ml
Big, hond: 10 - 50 ml

Wachttijd

Rund, varken, paard, schaap, hond
Vlees en slachtafval: 0 dagen
Melk: 0 dagen

Bijwerkingen

Geen bekend

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Deze hypertonische oplossing dient strikt intraveneus en langzaam toegediend te worden. Zo niet, dan kan deze hypertonische oplossing pijn en irritatie op de injectieplaats veroorzaken.

Aangezien sorbitol reeds bestaande acidose kan verergeren, is toediening van het product niet aanbevolen bij dieren met ernstige acidose.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

De veiligheid van het product bij drachtige dieren en dieren in lactatie is niet onderzocht. Men verwacht echter geen problemen bij gebruik van drachtige dieren of dieren in lactatie.

Overdosering

Overdosering kan leiden tot overhydratatie met verhoogde huidspanning, veneuze congestie en mogelijks ook longoedeem. Behandeling hiervan is zuiver symptomatisch.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Bewaren beneden 25 °C.

Houdbaarheid in verkoopverpakking: 36 maanden.

Houdbaarheid na openen van de primaire verpakking: 28 dagen.