

Trisulmix injectable

Vertaling van de originele SPC t.b.v. de vrijstelling voor het gebruik van diergeneesmiddelen bij geiten

Registratiehouder / Registratienummer

Dopharma France
FR/V/9930567 1/1992
Op diergeneeskundig voorschrift

Verpakking

Flacon 100 ml

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Samenstelling

Per ml:
sulfadimethoxine (als natrium zout)
186 mg
trimethoprim 40 mg

Doeldieren

Rund, varken, schaap, geit

Indicaties

Rund, varken, schaap, geit:

Behandeling van luchtweginfecties, gastro-intestinale infecties, urogenitale infecties en klinische mastitis veroorzaakt door voor sulfadimethoxine en trimethoprim gevoelige micro-organismen.

Toediening/dosering

Rund, varken, schaap, geit:

Intramusculair, traag intraveneus of subcutaan

18,6 mg sulfadimethoxine en 4 mg trimethoprim per kg lichaamsgewicht per dag (overeenkomend met 1 ml per 10 kg lichaamsgewicht per dag) gedurende 3 opeenvolgende dagen.

Wachttijd

Rund, schaap, geit:

(orgaan)vlees en slachtafval: 12 dg
melk: 6 dg

Varken:

(orgaan)vlees en slachtafval: 12 dg

Contra-indicaties

- Overgevoeligheid voor sulfamiden en/of trimethoprim.
- Ernstige nier- of leverinsufficiëntie.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Speciale waarschuwingen

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

Geef de behandelde dieren tijdens en na de behandeling voldoende water.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient

Personen met een bekende overgevoeligheid voor sulfamiden en/of trimethoprim dienen contact met het product te vermijden.

Indien u symptomen ontwikkelt na blootstelling, zoals huidirritatie, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwing te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen of ogen of ademhalingsmoeilijkheden zijn ernstigere symptomen en vereisen onmiddellijke medische aandacht.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg

Teratogene en foetotoxische effecten zijn waargenomen bij proefdieren die behandeld zijn met dosissen hoger dan de aanbevolen therapeutische doses.

Gebruik wordt afgeraden tijdens de dracht.

Bewaarcondities/houdbaarheid

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 30 maanden.

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Bewaren beneden 25 °C.