

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Acetylsalicylzuur				
Preventiron®	1 kg	Kalf	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg
Aspirine 50 Coophavet (cascade)	1 kg	Rund, Kalf, Varken, Pluimvee, Paard, Lam (geit,schaap)	Oraal poeder	Varken, pluimvee: (orgaan)vlees: 1 dg Kalf, paard, schaap (lam) en geit (lam): (orgaan)vlees: 7 dg Eieren: Bij een afwezigheid van een wachttijd voor eieren, niet gebruiken bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren, in een tijdspanne van 4 weken voor de leg en tijdens de leg.
Amoxicilline				
Amoxicilline 100 inj	100 ml	Rund, Varken, Hond, Kat	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 28 dg; melk: 84 uur Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg
Amoxicilline 150 inj	100 ml	Varken	Injectie	Varken: vlees en slachtafval: 42 dg; IKB: 42 dg
Amoxy Active® 131 mg/g	5 kg	Varken	Oraal poeder	Varken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg
Amoxy Active® 697 mg/g	1 kg 5 kg	Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Varken: vlees en slachtafval: 2 dg; IKB: 2 dg Kip (vleeskuiken, opfoklegghen, fokdier): vlees en slachtafval: 1 dg Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.
Amoxy Active® CTD 697 mg/g	1 kg	Pluimvee (kip, kalkoen, eend)	Oraal poeder	Kip (vleeskuiken, opfoklegghen, vleeskuiken-ouderdier): vlees en slachtafval: 1 dg Kalkoen: vlees en slachtafval: 5 dg Eend (vleeskuiken, ouderdier): vlees en slachtafval: 9 dg Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren. Niet gebruiken binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.
Trymox LA 150 mg/ml	100 ml	Rund, Varken, Schaap, Hond, Kat	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 39 dg; melk: 4,5 dg Varken: vlees en slachtafval: 42 dg Schaap: vlees en slachtafval: 29 dg Niet toegestaan voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.
Ampicilline				
Ampi-Dry 5000®	5 g	Rund, Paard	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 5 dg; melk: 2 dg Paard: vlees en slachtafval: 5 dg
Ampisol® 100%	500 g	Kalf, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Kalf: vlees en slachtafval: 2 dg Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg Slachtkuiken: vlees en slachtafval: 1 dg Niet voor gebruik bij legvogels die eieren voor humane consumptie produceren.

Uitgebreide productinformatie www.dopharma.nl of in de SPC (te vinden op www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl)

Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX - Postbus 205 - 4940 AE- Raamsdonksveer - Nederland - www.dopharma.nl

☎ Customer Service: +31 (0) 162 58 20 20

✉ cs@dopharma.com

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Ampicilline (vervolg)				
Ampisol Coophavet (cascade)	5 kg	Rund, Kalf, Varken, Pluimvee, Lam (geit,schaap),	Oraal poeder	(Orgaan)vlees: 8 dg Eieren: bij gebrek aan een MRL voor eieren, mag dit product niet gebruikt worden bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren gedurende 4 weken voor legperiode tot einde van deze periode.
Atropine				
Atropine Sulfurica 1% 10 mg/ml (cascade)	20 ml	Rund, Varken, Pluimvee, Paard, Schaap, Geit, Hond, Kat	Injectie	0 dg
Broomhexine				
Broomhexine 2%	1 kg	Kalf	Oraal poeder	Rund (kalveren): vlees en slachtafval: 0 dg
Dophexine® 20 mg/g	1 kg 5 kg	Rund, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 2 dg Varken: vlees en slachtafval: 0 dg Kip, kalkoen, eend: vlees en slachtafval: 0 dg Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken tijdens en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.
Busereline				
Fertigest® 0,004 mg/ml	5x20 ml	Rund, Varken, Paard, Konijn	Injectie	Rund (koe): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 uur Varken (zeug, gelt): vlees en slachtafval: 0 dg Paard (merrie): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg Konijn (moer voor reproductie): vlees en slachtafval: 0 dg
Veterelin 0,004 mg/ml	5x10 ml	Rund, Paard, Varken, Konijn	Injectie	Rund (koe): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 uur Varken (zeug, gelt): vlees en slachtafval: 0 dg Paard (merrie): vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg Konijn (moer voor reproductie): vlees en slachtafval: 0 dg
Calciumgluconaat - magnesiumchloride				
Calciummagnesium-ject	450 ml	Rund	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg
Calciummagnesium-ject	750 ml	Rund, Schaap	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg Schaap: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg

Uitgebreide productinformatie www.dopharma.nl of in de SPC (te vinden op www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl)

Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX - Postbus 205 - 4940 AE- Raamsdonksveer - Nederland - www.dopharma.nl

☎ Customer Service: +31 (0) 162 58 20 20

✉ cs@dopharma.com

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Calciumgluconaat - magnesiumchloride (vervolg)				
Cofacalcium (cascade)	500 ml	Rund, Varken, Paard, Schaap, Geit, Hond, Kat	Injectie	Rund, schaap, geit, paard, varken: vlees en slachtafval: 0 dg Rund, schaap, geit: melk: 0 dg
Colistine				
Coldostin® 4 800 000 I.E./g	1 kg	Kalf, Varken, Pluimvee, Lam	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 1 dg Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg Kip: vlees en slachtafval: 1 dg; ei: 0 dg Kalkoen: vlees en slachtafval: 1 dg; ei: 0 dg Schaap (lam): vlees en slachtafval: 1 dg
Colisol® 250 000 I.E./ml	5 ltr	Varken, Pluimvee	Orale opl.	Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg Pluimvee: vlees en slachtafval: 1 dg; ei: 0 dg
Colistine 1200	5 kg	Kalf, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 7 dg Varken: vlees en slachtafval: 7 dg; IKB: 7 dg Kip: vlees en slachtafval: 7 dg; ei: 7 dg
D-cloprostenol natrium				
Indupart® 75 µg/ml	5x20 ml	Rund, Varken, Paard	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 uur Varken: vlees en slachtafval: 1 dg Paard: vlees en slachtafval: 2 dg; melk: 0 uur
Dexamethason				
Dexa-ject® 2 mg/ml	50 ml 100 ml	Rund, Varken, Paard, Hond, Kat	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 8 dg; melk: 72 uur Varken: vlees en slachtafval: 2 dg Paard: vlees en slachtafval: 8 dg Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.
Dexa-ject® UDA 2 mg/ml	50 ml 100 ml	Rund, Varken, Paard, Hond, Kat	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 8 dg; melk: 72 uur Varken: vlees en slachtafval: 2 dg Paard: vlees en slachtafval: 8 dg Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.
Doxycycline				
Doxylin® 50% WSP	1 kg 5 kg	Kalf, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Niet herk. kalf: vlees en slachtafval: 7 dg Varken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg Kip: vlees en slachtafval: 5 dg Niet voor gebruik bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren. Niet voor gebruik bij runderen die melk voor humane consumptie produceren.

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Doxycycline (vervolg)				
Doxylin® 100%	1 kg	Kalf, Varken	Oraal poeder	Rund (niet-herkauwend kalf): vlees en slachtafval: 14 dg Varken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg
Doxylin® CT WSP 500 mg/g	1 kg	Pluimvee (kip, kalkoen)	Oraal poeder	Kip (vleeskuiken, vleeskuikenfokdier): vlees en slachtafval: 5 dg Kalkoen (vleeskuiken, fokdier): vlees en slachtafval: 12 dg Niet voor gebruik bij vogels die bestemd zijn om eieren voor humane consumptie te produceren.
Doxycycline - Broomhexine				
Drinkmix Doxy-B® 5%	1 kg	Kalf, Varken	Oraal poeder	Rund (kalveren): vlees en slachtafval: 28 dg Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg
Duivenvaccin				
Columba	100 ds	Duif	Paramyxo	Duif: 0 dg
Diftovac (cascade)	50 ds	Duif	Pokken	Duif: 0 dg
Pharmavac PHA	50 ds	Duif	Paramyxo, Herpes, Adeno	Duif: (orgaan)vlees: 0 dg
RP Vacc	50 ds	Duif	Rota, Paramyxo	Duif: 0 dg
Electrolyten				
Effy Tabs	48x50 g	Kalf	Bruistabl.	N.v.t.
Hydroforce	48x47 g	Kalf, Big, Lam, Geitenlam	Bruistabl.	N.v.t.
Enrofloxacin				
Doraflox® 100 mg/ml	100 ml	Rund, Varken	Injectie	Rund: i.v.: vlees en slachtafval: 5 dg; melk: 3 dg s.c.: vlees en slachtafval: 12 dg; melk: 4 dg Varken: vlees en slachtafval: 13 dg
Fenbendazole				
Curofen 50 mg/g	1 kg	Varken	Oraal poeder	Varken: vlees en slachtafval: 6 dg
Fenoxymethylpenicilline				
Phenoxyphen® WSP 325 mg/g	1 kg	Pluimvee	Oraal poeder	Kip: vlees en slachtafval: 2 dg; ei: 0 dg

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Fenylbutazon				
Butagran Equi® 200 mg/g (cascade)	20x5 g	Paard	Oraal poeder	Paard: Niet voor gebruik in paarden die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Behandelde paarden mogen nooit meer worden geslacht voor menselijke consumptie. Het paard moet worden verklaard als niet bestemd voor menselijke consumptie onder nationale paardenpaspoortwetgeving.
Florfenicol				
Flordofen® 300 mg/ml	100 ml	Rund, Varken	Injectie	Rund: vlees en slachtafval / IM toediening: 30 dg; vlees en slachtafval / SC toediening: 44 dg Varken: vlees en slachtafval: 18 dg; IKB: 18 dg Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren, inclusief gebruik gedurende de droogstand.
Flubendazole				
Feedmix Fludoprex® 0,6%	5 kg	Varken, Pluimvee	FM/Attest	Varken: vlees en slachtafval: 5 dg Kip: vlees en slachtafval: 7 dg; ei: 0 dg Fazant: vlees en slachtafval: 28 dg
Flubendazole 5% Topdressing	5 kg	Varken	Topdressing	Varken: vlees en slachtafval: 5 dg
Fludosol® 200 mg/ml	250 ml 1 ltr	Varken, Pluimvee	Orale opl.	Varken: vlees en slachtafval: 4 dg Kip: vlees en slachtafval: 2 dg; ei: 0 dg
Flumequine				
Enterflume® kalf/kip	1 kg	Kalf, Pluimvee	Oraal poeder	Kalf: vlees en slachtafval: 2 dg Kip: vlees en slachtafval: 2 dg Niet voor gebruik bij kippen die eieren voor humane consumptie produceren.
Flunixin				
Niglumine 50 mg/ml	100 ml	Rund, Varken, Paard	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 4 dg; melk: 24 uur Varken: vlees en slachtafval: 28 dg Paard: vlees en slachtafval: 28 dg Niet voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.
Gentamycine				
Genta-ject® 10%	100 ml	Kalf	Injectie	Rund (kalf tot de leeftijd van 13 weken): vlees en slachtafval: 139 dg Vanwege ophoping van gentamicine in lever, in nieren en op de injectieplaats moet een herhaalde behandelingskuur tijdens de wachttijd worden vermeden.

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Griseofulvine				
Dermogine (cascade)	20x175 g	Paard, Hond, Kat	Oraal poeder	Paard: (orgaan)vlees: 6 maanden Melk: verboden toe te dienen aan merries waarvan de melk bestemd is voor menselijke consumptie
Infuusvloeistoffen				
Calciummagnesium-ject	450 ml	Rund	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg
Calciummagnesium-ject	750 ml	Rund, Schaap	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg Schaap: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg
Cofacalcium (cascade)	500 ml	Rund, Varken, Paard, Schaap, Geit, Hond, Kat	Injectie	Rund, schaap, geit, paard, varken: vlees en slachtafval: 0 dg Rund, schaap, geit: melk: 0 dg
D. Hydrat (cascade)	500 ml	Rund	Injectie	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg
Rehydex 2414 (cascade)	500 ml	Rund, Varken, Paard, Schaap, Hond	Injectie	Vlees en slachtafval: 0 dg Melk: 0 dg
Speciale 2411® (cascade)	500 ml	Kalf	Injectie	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg
Koper				
Copper-Sol 50 mg/ml	5 ltr	Varken, Pluimvee, Gevogelte	Orale opl.	Varken: vlees en slachtafval: 0 dg Pluimvee: vlees en slachtafval: 0 dg; ei: 0 dg
Ketoprofen				
Aristal 100 mg/ml	100 ml	Rund, Varken	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 4 dg; melk: 0 uur Varken: vlees en slachtafval: 4 dg
Lactoserum (geconcentreerd runderlactoseresum bevattende specifieke IgG tegen E.coli)				
Locatim Oraal	60 ml	Kalf	Orale opl.	Rund (pasgeboren kalf jonger dan 12 uren): (orgaan)vlees: 0 dg
Levamisole				
Leva Oraal 10%	5 ltr	Rund, Varken	Orale opl.	Niet-melkgevend rund: vlees en slachtafval: 28 dg Varken: vlees en slachtafval: 15 dg
Némisol injectable (cascade)	250 ml	Rund, Schaap, Varken	Injectie	Rund, schaap, varken: vlees en slachtafval: 3 dg Melk: door afwezigheid van een MRL voor melk, mag dit product niet worden gebruikt: in dieren die melk voor humane consumptie produceren; tijdens droogstand; tijdens de twee maanden voorafgaand aan de partus.

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Lincomycine				
Lincomycine 20%	150 g	Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Varken: vlees en slachtafval: 7 dg; IKB: 7 dg Niet-eierlegend pluimvee: vlees en slachtafval: 10 dg
Meloxicam				
Melovem® 5 mg/ml	100 ml	Rund, Kalf, Varken	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 15 dg Varken: vlees en slachtafval: 5 dg Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Melovem® 15 mg/ml	250 ml	Paard	Orale opl.	Paard: vlees en slachtafval: 3 dg Niet voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.
Melovem® 20 mg/ml	50 ml 100 ml	Rund, Varken, Paard	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 15 dg; melk: 5 dg Varken: vlees en slachtafval: 5 dg Paard: vlees en slachtafval: 5 dg Niet toegestaan bij paarden die melk voor menselijke consumptie produceren.
Melovem® 30 mg/ml	50 ml 100 ml	Rund, Varken	Injectie	Rundvee: vlees en slachtafval: 15 dg; melk: 5 dg Varken: vlees en slachtafval: 5 dg
Menbuton				
Mendotizer®	100 ml	Rund, Varken, Paard, Schaap, Geit	Injectie	Rund, paard, schaap en geit: vlees en slachtafval: 0 dg na IV toediening; vlees en slachtafval: 1 dag na IM toediening; melk: 0 dg Varken: vlees en slachtafval: na IV toediening: 0 dagen; na IM toediening: 1 dag
Natriumjodide				
Iodure Veto-veine (cascade)	250 ml	Rund	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg
Natriumsalicylaat				
Dophacyl® SB 1000 mg/g	1 kg 5 kg	Rund, Varken	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varken: vlees en slachtafval: 0 dg
Dophacyl® T 1000 mg/g	1 kg	Kalkoen	Oraal poeder	Kalkoen: vlees en slachtafval: 2 dg Niet gebruiken bij vogels (die bestemd zijn) om eieren voor humane consumptie (te) produceren.
Na-salicylaat 100%	1 kg 5 kg	Kalf, Varken	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg Varken: vlees en slachtafval: 0 dg

Uitgebreide productinformatie www.dopharma.nl of in de SPC (te vinden op www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl)

Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX - Postbus 205 - 4940 AE- Raamsdonksveer - Nederland - www.dopharma.nl

☎ Customer Service: +31 (0) 162 58 20 20

✉ cs@dopharma.com

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Natriumsalicylaat (vervolg)				
Sodium Salicyl® 80% WSP	5 kg	Kalf, Varken	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 0 dg Varken: vlees en slachtafval: 0 dg
Neomycine				
Neomycine 50 Coophavet (cascade)	1 kg	Rund, Kalf, Varken, Pluimvee, Schaap, Geit, Lam, Konijn	Oraal poeder	Rund, schaap, geit: (orgaan)vlees: 14 dg melk: niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Varken, konijn: (orgaan)vlees: 14 dg Pluimvee: (orgaan)vlees: 14 dg; ei: 0 dg
Oxytetracycline				
Oxy 500 Topdressing	5 kg	Varken	Topdressing	Varken: vlees en slachtafval: 14 dg; IKB: 14 dg
Oxy LA INJ	100 ml	Rund, Kalf, Varken	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 28 dg Varken: vlees en slachtafval: 21 dg; IKB: 21 dg Niet toegestaan voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Oxymax® 100 mg/ml	100 ml	Rund, Kalf, Varken	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 21 dg; melk: 5 dg Kalf: vlees en slachtafval: 21 dg Varken: vlees en slachtafval: 21 dg; IKB: 21 dg
Oxytetracycline HCl	800 g 5 kg	Kat, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Rund (niet herk. kalf): vlees en slachtafval: 8 dg Varken: vlees en slachtafval: 5 dg; IKB: 5 dg Kip: vlees en slachtafval: 8 dg; ei: 4 dg
Oxytocin				
Oxytocin-ject	50 ml	Rund, Varken, Paard, Hond, Kat	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg Varken: vlees en slachtafval: 0 dg Paard: vlees en slachtafval: 0 dg
Oxyclozanide				
Distocur® 34 mg/ml	1 ltr 5 ltr	Rund, Schaap	Orale opl.	Rund: vlees en slachtafval: 13 dg; melk: 4,5 dg (108 uur) Schaap: vlees en slachtafval: 14 dg; melk: 7 dg (168 uur)
Procaïne benzylpenicilline				
Penject 30®	100 ml	Varken	Injectie	Varken: vlees en slachtafval: 9 dg; IKB: 9 dg
Procaïne benzylpenicilline -Dihydrostreptomycine				
Penstrep-ject®	100 ml	Rund, Kat, Varken, Big, Schaap, Lam, Hond, Kat	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 56 dg; melk: 5 dg Varken: vlees en slachtafval: 49 dg; IKB: 49 dg Big: vlees en slachtafval: 49 dg Kalf, schaap, lam: vlees en slachtafval: 56 dg Niet voor gebruik bij schapen die melk voor menselijke consumptie produceren.

Uitgebreide productinformatie www.dopharma.nl of in de SPC (te vinden op www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl)

Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX - Postbus 205 - 4940 AE- Raamsdonksveer - Nederland - www.dopharma.nl

☎ Customer Service: +31 (0) 162 58 20 20

✉ cs@dopharma.com

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Spiramycine				
Suanovil 50 (cascade)	100 g 1 kg	Rund, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 21 dg Varken: vlees slachtafval: 21 dg Pluimvee: vlees en slachtafval: 10 dg Eieren: bij gebrek aan een MRL voor eieren niet gebruiken bij leghennen die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken tijdens en binnen 4 weken vóór het begin van de legperiode.
Sulfadimidine-Na				
Sulfadimidine-Na	800 g	Rund, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Rundvee: vlees en slachtafval: 12 dg Varken: vlees en slachtafval: 15 dg; IKB zeug: 15 dg; IKB big: < 25 kg of < 10 wkn: 15 dg Pluimvee: vlees en slachtafval: 15 dg Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet voor gebruik bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Tilmicosine				
Tildosin® 250 mg/ml	960 ml	Kalf, Pluim- vee, Varken	Orale opl.	Kalf: vlees en slachtafval: 42 dg Varken: vlees en slachtafval: 14 dg Kip: vlees en slachtafval: 12 dg Kalkoen: vlees en slachtafval: 19 dg Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken binnen 2 weken vóór het begin van de legperiode.
Tildosin® 300 mg/ml	100 ml	Rund, Schaap	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 70 dg; melk: 36 dg Schaap: vlees en slachtafval: 42 dg; melk: 18 dg Als het diergeneesmiddel aan koeien tijdens de droogstand of aan drachtige vaarzen wordt toegediend, mag de melk tot 36 dagen na het kalven niet voor humane consumptie gebruikt worden. Als het diergeneesmiddel aan ooien tijdens de droogstand of aan drachtige ooien wordt toegediend mag de melk tot 18 dagen na het lammeren niet voor humane consumptie gebruikt worden.
Tilmicosine - ketoprofen				
Keytil® 300 mg/ml + 90 mg/ml	50 ml	Rund, Kalf	Injectie	Rund (kalf ≤ 330 kg): vlees en slachtafval: 93 dg Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Toltrazuril				
Dozuril® 25 mg/ml	1 ltr	Pluimvee	Orale opl.	Kip (opfokleggen, fokdier): vlees en slachtafval: 16 dg Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.
Dozuril® CT 25 mg/ml	1 ltr	Pluimvee (kalkoen)	Orale opl.	Kip (opfokleggen, fokdier): vlees en slachtafval: 16 dg Kalkoen: vlees en slachtafval: 16 dg Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij opfoklegghennen na de 15e levensweek.
Dozuril® 50 mg/ml	250 ml 1 ltr	Varken (big)	Orale opl.	Varken (biggen 3 – 5 dg oud): vlees en slachtafval: 61 dg
Trichlormethiazide - Dexamethason				
Oedex sachet (cascade)	40x20 g	Rund, Varken, Paard	Oraal poeder	Rund, varken en paard: vlees en slachtafval: 6 dagen melk: 3 dagen
Trimethoprim-Sulfa (SDZ=Sulfadiazine) (SDX=Sulfadoxine) (SMX=Sulfamethoxazole) (SDMX=Sulfadimethoxine)				
Cubarmix® 48% (SDZ)	800 g	Kalf	Oraal poeder	Kalf: vlees en slachtafval: 12 dg
Dofatrim-ject® 40/200 mg/ml (SDX)	100 ml	Rund, Varken	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 14 dg; melk: 3 dg Varken: vlees en slachtafval: 7 dg IKB zeug: 7 dg IKB big < 25 kg of jonger dan 10 wkn: 7 dg
Feedmix TS Topdressing®	5 kg	Varken	Topdressing	Varken: vlees en slachtafval: 3 dg; IKB: 3 dg
TMP/SMZ INJ. (SMX)	100 ml	Rund, Varken	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 12 dg; melk: 4 dg Varken: vlees en slachtafval: 12 dg; IKB zeug: 12 dg; IKB big: < 25 kg of < 10 wk: 12 dg
Trim/Sul 80/420 (SDZ)	1 kg 5 kg	Kalf, Varken, Big, Pluimvee	Oraal poeder	Kalf: vlees en slachtafval: 14 dg Varken: vlees en slachtafval: 28 dg; IKB: 28 dg Big: vlees en slachtafval: 12 dg; IKB 28 dg Slachtkuiken: vlees en slachtafval: 12 dg
T.S.-Sol® (SMX)	5 ltr	Varken, Pluimvee	Orale opl.	Varken: vlees en slachtafval: 5 dg; IKB: 5 dg Slachtkip: vlees en slachtafval: 7 dg
T.S.-Sol® 20/100 (SMX)	5 ltr	Varken, Pluimvee	Orale opl.	Vleesvarken: vlees en slachtafval: 8 dg; IKB: 8 dg Vleeskuiken: vlees en slachtafval: 5 dg

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Trimethoprim-Sulfa (vervolg) (SDZ=Sulfadiazine) (SDX=Sulfadoxine) (SMX=Sulfamethoxazole) (SDMX=Sulfadimethoxine)				
Trisulmix Poudre (Cascade) (SDMX)	1 kg 5 kg	Rund, Kalf, Varken, Pluimvee, Lam (geit,schaap), Konijn	Oraal poeder	Rund (kalf), varken, pluimvee, schaap (lam), geit (lam), konijn: (orgaan)vlees: 12 dg Eieren: niet gebruiken bij vogels die eieren voor menselijke consumptie produceren gedurende 4 weken voor legperiode tot einde van deze periode.
Tulatromycine				
Doraxx® 25 mg/ml	100 ml	Varken	Injectie	Varken: vlees en slachtafval: 13 dg
Doraxx® 100 mg/ml	100 ml	Rund, Varken, Schaap	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 22 dg Varken: vlees en slachtafval: 13 dg Schaap: vlees en slachtafval: 16 dg Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.
Tylosine				
Tylogran® 1000 mg/g	1 kg	Kalf, Varken, Pluimvee	Oraal poeder	Rund (kalf): vlees en slachtafval: 12 dg Varken: vlees en slachtafval: 1 dg; IKB: 1 dg Kip: vlees en slachtafval: 1 dg; ei: 0 dg Kalkoen: vlees en slachtafval: 2 dg; ei: 0 dg
Vitaminen – Mineralen – Sporenelementen etc.				
Heparenol®	5 ltr	Rund, Varken, Pluimvee, Paard, Schaap, Geit, Konijn	Orale opl.	Niet van toepassing
Ironject® 20 % + B12	100 ml	Rund, Kalf, Big, Hond	Injectie	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg Kalf: vlees en slachtafval: 0 dg Big: vlees en slachtafval: 0 dg
Multimin®	100 ml	Rund	Injectie	Vlees en slachtafval: 28 dagen Melk: 0 uur
Pid'Vet®	5 kg	Pluimvee, Varken	Oraal poeder	Niet van toepassing
Promotor L 47.0	5 ltr	Rund, Varken, Pluimvee, Paard, Schaap Geit, Konijn, Bij	Orale opl.	Niet van toepassing

Product	Verp.	Doeldier	Toepassing	Wachttijd
Vitaminen – Mineralen – Sporenelementen etc. (vervolg)				
Sedochol® Gold	500 ml 5 ltr	Rund, Varken, Pluimvee, Paard, Schaap, Geit, Konijn, Bij	Orale opl.	Niet van toepassing
Vitamine K Coophavet	10x100 g	Rund, Varken, Pluimvee, Schaap, Geit, Konijn	Oraal poeder	Niet van toepassing
Vitasol®-C 100%	1 kg	Rund, Varken, Pluimvee, Hond, Kat, Cavia	Oraal poeder	Rund: vlees en slachtafval: 0 dg; melk: 0 dg Varken: vlees en slachtafval: 0 dg Pluimvee: vlees en slachtafval: 0 dg; ei: 0 dg
Vitasol Multi®	5 ltr	Kalf, Varken, Pluimvee	Orale opl.	Kalf: vlees en slachtafval: 0 dg Varken: vlees en slachtafval: 0 dg Pluimvee: vlees en slachtafval: 0 dg; ei: 0 dg
Zinkdinaatrium-EDTA				
Intra Dysovinol 499 mg/ml	5 ltr 10 ltr	Varken	Orale opl.	Varken (vleesvarken): vlees en slachtafval: 0 dg

RIPAC-LABOR:
Bedrijfsspecifieke Vaccins Dophavacc (Autovaccins)
en Diagnostiek

Voor meer informatie: Dopharma Afdeling Technical Support
Mw. Dr. Chris Cornelis
Dhr. Drs. Bart Engelen
Mw. Drs. Sanne de Jong
Dhr. Dr. Kristof Haems

Uitgebreide productinformatie www.dopharma.nl of in de SPC (te vinden op www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl)

Dopharma Veterinaire Farmaca B.V. - Zalmweg 24 - 4941 VX - Postbus 205 - 4940 AE- Raamsdonksveer - Nederland - www.dopharma.nl

☎ Customer Service: +31 (0) 162 58 20 20

✉ cs@dopharma.com

Healthy livestock  Dopharma